

FRONTLINE Combo® Spot-On

Composition qualitative et quantitative

FRONTLINE Combo Spot-On Chat

Fipronil 50 mg. (S)-méthoprène 60.0 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.10 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.05 mg. Excipient QSP 1 pipette 0.5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S

Fipronil 67 mg. (S)-méthoprène 60.3 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.13 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.07 mg. Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M

Fipronil 134 mg. (S)-méthoprène 120.6 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.27 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.13 mg. Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L

Fipronil 268 mg. (S)-méthoprène 241.2 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.54 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.27 mg. Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL

Fipronil 402 mg. (S)-méthoprène 361.8 mg. Butylhydroxyanisole (E320) 0.80 mg.
Butylhydroxytoluène (E321) 0.40 mg. Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml.

Forme pharmaceutique

Solution pour spot-on. Solution claire ambrée.

Indications d'utilisation

A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et tiques et/ou les poux broyeurs.

Chez les chiens

Élimination des puces (*Ctenocephalides spp.*).

L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines.

Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application.

Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*).

Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines.

Élimination des poux broyeurs (*Trichodectes canis*).

Chez les chats

Élimination des puces (*Ctenocephalides spp.*).

L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant

4 semaines.

Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application.

Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*).

Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines.

Élimination des poux broyeurs (*Felicola subrostratus*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la *Dermatite par Allergie aux Piquûres de Puces* (DAPP).

Posologie

Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat.

Chiens : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et 6 mg de (S)-méthoprène par kg de poids corporel, en une application cutanée.

Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal (0.67 ml),

Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal (1.34 ml),

Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal (2.68 ml),

Chiens de plus de 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal (4.02 ml).

En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines.

Contre-indications

En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg.

Ne pas utiliser chez les animaux malades par exemple (maladies systémiques, fièvre) ou convalescents.

Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez le chat car cela peut conduire à un surdosage.

Effets indésirables

Chez les chats

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation.

En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de

l'excipient peut être observée.

Ne pas surdoser.

Chez les chiens

Parmi les effets secondaires très rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, perte de poils, démangeaison, rougeur localisées) ainsi que des démangeaisons ou une perte de poils généralisées ont été rapportés. Une salivation excessive, des signes nerveux réversibles (augmentation de la sensibilité à la stimulation, abattement, autres signes nerveux) ou des vomissements ont aussi été observés après utilisation. En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée. Ne pas surdoser.

Temps d'attente

Sans objet.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations

FRONTLINE Combo Spot-On Chat:

FR/V/3168431 0/2003

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.5 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien S:

FR/V/7543476 4/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 0.67 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien M:

FR/V/7565368 8/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 1.34 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien L:

FR/V/2879019 8/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 2.68 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml.

FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL:

FR/V/8787746 7/2003.

Plaquette thermoformée de 1 pipette à embout sécable de 4.02 ml.

Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Boîte de 2 plaquettes thermoformés de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml.

Date A.M.M. 23/01/03.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Classement du médicament en matière de délivrance

Usage vétérinaire.

Direction France - 13b avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE
Téléphone 04 72 72 63 22 - Fax 04 72 72 32 10

(validé AR - 26/3/2010)