

FRONTLINE[®] Spray Pompe 0.5 ml et 1.5 ml

Composition qualitative et quantitative

Fipronil 0.25 g. Excipient QSP 100 ml.

Forme pharmaceutique

Solution externe.

Indications d'utilisation

Affections à parasites sensibles au fipronil chez les *chiens et chats* de moins de 5 kg pour FRONTLINE Spray Pompe 0.5 ml et de plus de 5 kg pour FRONTLINE Spray Pompe 1.5 ml.

Chez les chiens

Prévention et traitement des infestations par les puces et les tiques.

Élimination des poux broyeurs.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les puces varie de 60 à 90 jours.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les tiques est d'environ 30 jours.

Chez les chats

Prévention et traitement des infestations par les puces.

Élimination des poux broyeurs.

Élimination des tiques.

Prévention des infestations par les tiques pendant 2 semaines.

La durée de protection contre les nouvelles infestations par les puces est d'environ 40 jours.

FRONTLINE Spray Pompe peut être intégré dans un programme thérapeutique de la *Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces* (DAPP).

Posologie

Voie d'administration : cutanée, en pulvérisation.

La posologie de base est de 7.5 mg/kg de fipronil soit 3 ml de solution par kg (6 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 2 pressions de la pompe 1.5 ml par kg). Cette posologie peut être portée jusqu'à 15 mg/kg de fipronil soit 6 ml de solution par kg (12 pressions de la pompe 0.5 ml par kg et 4 pressions de la pompe 1.5 ml par kg) pour tenir compte de la longueur des poils et permettre une imprégnation complète de l'animal.

En l'absence de données de tolérance, l'intervalle minimum de traitement est de 4 semaines.

Mode d'administration

Pulvériser sur toute la surface du corps, en maintenant le flacon à 10-20 cm environ.

Appliquer à rebrousse-poil, en ayant soin de couvrir la totalité de l'animal, afin de mouiller uniformément le pelage.

Faire pénétrer le produit jusqu'à la peau. Laisser sécher sans essuyer.

Surdosage

FRONTLINE Spray Pompe 0.5 ml est réservé au traitement des canins et félins de moins de 5 kg.

Le risque de provoquer des effets secondaires peut cependant augmenter dans le cas de surdosage.

Voir rubrique '*Effets indésirables*'.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents.
Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu.

Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

Il est important de veiller à ce que les animaux ne se lèchent pas entre eux.

Les animaux ne doivent pas être autorisés à nager dans les cours d'eau pendant les 2 jours suivant l'application (voir rubrique '*Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou déchets*').

Ne pas laver les animaux avec un shampoing pendant les 2 jours qui précèdent et qui suivent l'application du produit.

Des tiques attachées peuvent occasionnellement être observées. Pour cette raison, la transmission des maladies infectieuses ne peut pas être complètement exclue si les conditions sont défavorables.

Eviter le contact avec les yeux de l'animal.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux

Ce produit peut provoquer une irritation des muqueuses et des yeux. Il faut donc éviter le contact du produit avec la bouche et les yeux.

Les animaux ou les utilisateurs ayant une hypersensibilité connue aux insecticides ou à l'alcool devraient éviter le contact avec le médicament.

Eviter le contact du contenu avec les doigts. En cas de contact, se laver les mains avec de l'eau et du savon.

En cas d'exposition accidentelle des yeux, rincer à l'eau pure avec soin.

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas manipuler les animaux traités et ne pas autoriser les enfants à jouer avec les animaux traités jusqu'à ce que le pelage soit sec. Il est donc recommandé que les animaux ne soient pas traités dans la journée mais plutôt en début de soirée, et que les animaux récemment traités ne soient pas autorisés à dormir avec les propriétaires, surtout les enfants.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Comme pour tous les insecticides, il est recommandé de porter des gants et de traiter les animaux dans un local bien aéré.

Effets indésirables

En cas de léchage, une brève période d'hypersalivation due à la nature de l'excipient peut être observée.

Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, des réactions cutanées transitoires, érythème, prurit ou alopecie ont été rapportés après utilisation.

Exceptionnellement, de l'hypersalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abattement, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation.

Ne pas surdoser.

Durée de conservation

24 mois.

Précautions particulières de conservation

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de produit non utilisé ou de déchets

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Le fipronil peut nuire aux organismes aquatiques. Ne pas jeter le produit ou les emballages vides dans les étangs, les rivières et les ruisseaux.

Temps d'attente

Sans objet.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation (ou de ponte)

Les études de laboratoire n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène du fipronil chez le rat et le lapin.

La formulation est très bien tolérée par les chiots après traitement de la chienne en lactation.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON.

Présentations

Boîte de 1 flacon de 125 ml polyéthylène (rempli à 100 ml) et de 1 pompe doseuse délivrant 0.5 ml par pulvérisation 673 105.8.

Boîte de 1 flacon de 250 ml polyéthylène et de 1 pompe doseuse délivrant 1.5 ml par

pulvérisation 673 106.4.

Boîte de 1 flacon de 500 ml polyéthylène et de 1 pompe doseuse délivrant 1.5 ml par pulvérisation 673 107.0.

Direction France - 13b avenue Albert Einstein - 69100 VILLEURBANNE

Téléphone 04 72 72 63 22 - Fax 04 72 72 32 10

(validé AR - 29/10/2008)